

**FICHA TÉCNICA****TIPO DE FORMULACIÓN:** Polvo mojable (WP)**USO:** FUNGICIDA**INGREDIENTE ACTIVO:**

- Propamocarb..... 100g/kg,  
Nombre IUPAC: Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate hydrochloride
- Metalaxyl.....150 g/kg  
Nombre IUPAC: Methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate

**FORMULADOR:**

INTEROC S.A.  
Km16.5 vía Daule  
Guayaquil, Ecuador

**IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:**

INTEROC S.A. SUCURSAL COLOMBIA  
Autopista Bogotá - Medellín Km 3.4  
Centro Empresarial Metropolitano – Modulo 3,  
Bodega 13.  
Cota-Colombia  
Telf: (571)8415771 – (571)8415055

**REGISTRO NACIONAL ICA No. 529****MODO DE ACCIÓN:**

PREDOSTAR es un fungicida de contacto, sistémico y erradicante. Es absorbido a través de las raíces, tallos y hojas rápidamente.

Dirección:  
Autopista Medellín Km. 3,4  
Centro Empresarial Metropolitano  
Módulo 3 Bodega 13.  
Cota – Cundinamarca - Colombia

Teléfonos:  
+57 (1) 8415055  
+57 (1)3072390

**USO AGRÍCOLA**
**DOSIS Y MODO DE EMPLEO**

<b>*USO ORNAMENTALES</b>			
<b>CULTIVO</b>	<b>BLANCO BIOLÓGICO</b>	<b>DOSIS</b>	<b>P.R</b>
Rosa ( <i>Rosa sp.</i> )	Mildeo veloso ( <i>Peronospora sparsa</i> )	1.56 kg/ha ó 1.3 g/l	24 horas

*Pruebas de Fitotoxicidad en ROSA (Rosa sp.), CLAVEL (Dianthus caryophyllus) Y POMPÓN (Crysanthemum sp.).*

<b>CULTIVOS</b>	<b>BLANCO BIOLÓGICO</b>	<b>DOSIS</b>	<b>P.C</b>	<b>P.R</b>
Papa ( <i>Solanum tuberosum L.</i> )	Gota o Tizón Tardío ( <i>Phytophthora infestans</i> )	1.6 kg/ha	21 días	24 horas
Tomate ( <i>Lycopersicon esculentum</i> )		0.9 kg/ha ó 300 g/200 l	10 días	24 horas
Cebolla ( <i>Allium cepa L.</i> )	Mildeo veloso ( <i>Peronospora destructor</i> )	0.9 kg/ha ó 300 g/200 l	14 días	24 horas

**P.C:** Período de carencia

**P.R:** Período de reentrada

**MODO DE EMPLEO:**

**PREDOSTAR** es un fungicida que se debe aplicar cada 7 a 14 días, dependiendo de las condiciones agro-climáticas y la presencia de la enfermedad.

Dirección:  
Autopista Medellín Km. 3,4  
Centro Empresarial Metropolitano  
Módulo 3 Bodega 13.  
Cota – Cundinamarca - Colombia

Teléfonos:  
+57 (1) 8415055  
+57 (1)3072390

**COMPATIBILIDAD:**

No se recomienda mezclar con otros productos por problemas de incompatibilidad que puedan presentarse. En caso de necesidad de estas mezclas, se recomienda realizar primero pruebas sobre un pequeño número de plantas y evaluar tanto la efectividad como los problemas de manchado o pérdida de calidad de planta, antes de hacerlo a gran escala. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.

**PRECAUCIONES:**

No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar PREDOSTAR, en la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

Evitar aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas y realizar las aplicaciones en horas tempranas.

Evite contaminar con PREDOSTAR las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: II MODERADAMENTE PELIGROSO**

**AVISO AL AGRICULTOR:** el fabricante garantiza la composición y calidad del producto, no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor.

**Fecha de revisión y actualización:** 25 enero 2017

Dirección:  
Autopista Medellín Km. 3,4  
Centro Empresarial Metropolitano  
Módulo 3 Bodega 13.  
Cota – Cundinamarca - Colombia

Teléfonos:  
+57 (1) 8415055  
+57 (1)3072390